

Pour : généralistes addictologues et psychiatres

La consommation régulière et excessive d'alcool crée un état d'alcool-dépendance qui engendre des troubles de l'humeur (syndrome anxieux) et crée de fait un état dépressif.

Chez 70-80 % des alcool-dépendants, un mois d'abstinence normalise l'humeur.

Envers son entourage et ou son médecin, un alcoolique minimise ou nie son alcool-dépendance au profit d'une affection psychique (état dépressif) qui le déculpabilisera de son problème mais qui induira le diagnostic de son médecin sur une fausse piste.

En premier lieu et dans tous les cas, il est nécessaire de traiter l'alcool-dépendance par un arrêt de la consommation totale d'alcool.

Au cas contraire, la prescription de médicaments psychotropes ne réglera pas le problème et augmentera l'état dépressif. (mélange:alcool/psychotropes)

Prescrire des médicaments psychotropes pour traiter l'alcool-dépendance est **hors AMM**, les médicaments psychotropes sont prévus pour traiter les troubles de l'humeur.

Le mélange alcool/médicaments psychotropes occasionnera inéluctablement des dégâts psychophysiques (lésions irréversibles des cellules et neurones du cerveau) engendrant de véritables maladies psychiques, pouvant amener au suicide et ou raptus suicidaire.

Le problème avec les généralistes, addictologues, psychiatres est qu'ils s'entêtent à vouloir soigner l'état dépressif avant de traiter le problème alcool et cela crée une multiplication de personnes en souffrance.

Donc en tout premier lieu il faut traiter l'alcool-dépendance. Comment? Deux solutions:

1. Faire une cure dans un centre spécialisé (avec risque de rechute)
2. Utiliser un médicament (non psychotrope) qui s'appelle :BACLOFENE
Ce médicament, utilisé hors AMM supprime l'envie, et rend indifférent au besoin de consommer de l'alcool.

Il est moins dangereux d'utiliser le BACLOFENE **hors AMM** que des médicaments psychotropes tel que: anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques, anti-psychotiques, etc... etc ...

Voir les renseignements utiles www.stop-alcool.eu www.forum-baclofene.fr

Différence entre la cure et le baclofène

Après un mois de cure, le malade devient abstinent.

Mais il n'est pas à l'abri d'une rechute, car la mémoire se souvient à vie et il est confronté quotidiennement à l'envie, à lui de savoir résister.

Et le jour où il succombe à la tentation, il replonge.

L'effet du baclofène est inverse, il n'est pas nécessaire de résister à la tentation de boire car il procure un état d'indifférence.